

Đáp án đề thi môn Sinh mã đề 215 THPT
Quốc Gia năm 2017

Đề Thi THPT Quốc Gia

Đề Thi Môn Sinh THPT Quốc Gia – Đề Thi THPT Quốc Gia 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 06 trang)

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:

Mã đề thi 215

Số báo danh:

Câu 81. Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

- A. kích thước tối thiểu của quần thể. B. kích thước tối đa của quần thể.
C. mật độ cá thể của quần thể. D. kiểu phân bố của quần thể.

Câu 82. Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới?

- A. Hội chứng Claiphento. B. Hội chứng AIDS.
C. Hội chứng Tocnơ. D. Hội chứng Đao.

Câu 83. Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau từ một phôi ban đầu?

- A. Cấy truyền phôi. B. Lai tế bào sinh dưỡng.
C. Nhân bản vô tính. D. Gây đột biến nhân tạo.

Câu 84. Quan hệ giữa cây phong lan sống trên cây thân gỗ và cây thân gỗ này là quan hệ

- A. ức chế - cảm nhiễm. B. kí sinh. C. hội sinh. D. cộng sinh.

Câu 85. Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu.

Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất?

- A. Diều hâu. B. Sâu ăn lá ngô. C. Cây ngô. D. Nhái.

Câu 86. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?

- A. Chọn lọc tự nhiên. B. Đột biến.
C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 87. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố đột biến có vai trò nào sau đây?

- A. Làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
B. Quy định chiều hướng tiến hóa.
C. Tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
D. Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

Câu 88. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội $2n$. Cây từ bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm sắc thể là

- A. $4n$. B. n . C. $2n$. D. $3n$.

Câu 89. Trong phân tử mARN **không** có loại đơn phân nào sau đây?

- A. Adenin. B. Uraxin. C. Xitôzin. D. Timin.

Câu 90. Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen $AaBBDd$ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

- A. 6. B. 2. C. 8. D. 4.

Câu 91. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư và côn trùng phát sinh ở ki nào sau đây?

- A. Ki Đêvôn. B. Ki Silua. C. Ki Ocdôvic. D. Ki Pecmi.

Câu 92. Một quần thể có thành phần kiểu gen là: $0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa$. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?

- A. 0,4. B. 0,6. C. 0,5. D. 0,3.

Câu 93. Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lý thường xảy ra ở các loài động vật ít di chuyển.
- B. Cách li địa lý trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiềm gen của quần thể.
- C. Cách li địa lý luôn dẫn đến cách li sinh sản và hình thành nên loài mới.
- D. Cách li địa lý góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiềm gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

Câu 94. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Kích thước quần thể thường dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa.
- B. Các quần thể cùng loài luôn có kích thước quần thể giống nhau.
- C. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.
- D. Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng cao.

Câu 95. Hệ sinh thái nào sau đây thường có độ đa dạng loài cao nhất?

- A. Đồng rêu hàn đới.
- B. Rừng mưa nhiệt đới.
- C. Rừng lá kim phương Bắc.
- D. Rừng rụng lá ôn đới.

Câu 96. Khi nói về quá trình phiên mã, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Trong quá trình phiên mã có sự tham gia của ribôxôm.
- B. Enzym xúc tác cho quá trình phiên mã là ADN polimeraza.
- C. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
- D. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều $5' \rightarrow 3'$.

Câu 97. Phép lai P: $\frac{Ab}{aB} \times \frac{ab}{ab}$, thu được F₁. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, F₁ có số cá thể mang kiểu hình trội về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ

- A. 40%.
- B. 20%.
- C. 10%.
- D. 30%.

Câu 98. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

- A. X^aX^a × X^AY.
- B. X^AX^a × X^AY.
- C. X^AX^A × X^aY.
- D. X^AX^a × X^aY.

Câu 99. Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Đột biến diêm là dạng đột biến liên quan đến một số cặp nuclêotit trong gen.
- B. Trong tự nhiên, đột biến gen thường phát sinh với tần số thấp.
- C. Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc của gen.
- D. Đột biến gen có thể tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.

Câu 100. Phép lai P: ♀ X^AX^a × ♂ X^aY, thu được F₁. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F₁, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

- A. X^AX^AX^a.
- B. X^aX^aY.
- C. X^AX^AY.
- D. X^AX^aX^a.

Câu 101. Ví dụ nào sau đây minh họa cho kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kỳ?

- A. Ở Việt Nam, số lượng cá thể của quần thể ếch đồng tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khô.
- B. Số lượng sâu hại lúa trên một cánh đồng lúa bị giảm mạnh sau một lần phun thuốc trừ sâu.
- C. Số lượng cá chép ở Hồ Tây bị giảm mạnh do ô nhiễm môi trường nước vào năm 2016.
- D. Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng bị giảm mạnh sau cháy rừng vào năm 2002.

Đề Thi THPT Quốc Gia

Câu 102. Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh.
- II. Quan hệ dinh dưỡng giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.
- III. Tôm, cá rô và chim bói cá thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau.
- IV. Sự tăng, giảm số lượng tôm sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng cá rô.

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 103. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đây?

- A. Luôn dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật.
- B. Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.
- C. Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
- D. Làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.

Câu 104. Khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Lưới thức ăn của quần xã rừng mưa nhiệt đới thường phức tạp hơn lưới thức ăn của quần xã thảo nguyên.
- B. Quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp.
- C. Trong lưới thức ăn, một loài sinh vật có thể là mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn.
- D. Trong chuỗi thức ăn, bậc dinh dưỡng cao nhất luôn có sinh khối lớn nhất.

Câu 105. Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:

Quần thể	A	B	C	D
Diện tích khu phân bố (ha)	25	240	193	195
Mật độ (cá thể/ha)	10	15	20	25

Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể đều không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Quần thể A có kích thước nhỏ nhất.
- II. Kích thước quần thể B lớn hơn kích thước quần thể C.
- III. Nếu kích thước của quần thể B và quần thể D đều tăng 2%/năm thì sau một năm kích thước của hai quần thể này sẽ bằng nhau.
- IV. Thứ tự sắp xếp của các quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn là: A, C, B, D.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 106. Khi nói về opéron Lac ở vi khuẩn *E. coli*, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

- I. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của opéron Lac.
- II. Vùng vận hành (O) là nơi ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
- III. Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) không phiên mã.
- IV. Khi gen cấu trúc A và gen cấu trúc Z đều phiên mã 12 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 12 lần.

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 107. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định. Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen D, d quy định. Cho cây hoa đỏ, thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F₁ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân thấp : 1 cây hoa trắng, thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F₁ có bao nhiêu loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, thân cao?

A. 9. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 108. Một loài sinh vật ngẫu phôi, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Bốn quần thể của loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền và có tần số các cá thể mang kiểu hình trội như sau:

Quần thể	I	II	III	IV
Tần số kiểu hình trội	96%	64%	75%	84%

Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Tần số kiểu gen Aa của quần thể I lớn hơn tần số kiểu gen Aa của quần thể II.
- B. Quần thể III có tần số kiểu gen AA bằng tần số kiểu gen aa.
- C. Tần số kiểu gen Aa của quần thể III nhỏ hơn tần số kiểu gen Aa của quần thể II.
- D. Quần thể IV có tần số kiểu gen Aa lớn gấp 2 lần tần số kiểu gen aa.

Câu 109. Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F₁ gồm 4 loại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn; không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?


- A. Trong tổng số cây thân cao, quả chua ở F₁, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 4/7.
- B. Hai cặp gen đang xét cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể.
- C. F₁ có 10 loại kiểu gen.
- D. Trong quá trình giảm phân của cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.

Câu 110. Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, kiểu gen Bb quy định hoa hồng; hai cặp gen này phân li độc lập. Cho cây thân cao, hoa trắng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P), thu được F₁ gồm 100% cây thân cao, hoa hồng. Cho F₁ tự thụ phấn, thu được F₂. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

- A. F₂ có 18,75% số cây thân cao, hoa trắng.
- B. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F₂, số cây thuần chủng chiếm 25%.
- C. F₂ có 12,5% số cây thân thấp, hoa hồng.
- D. F₂ có 2 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa hồng.

Câu 111. Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được ký hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ăn.
- II. Có 2 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.
- III. Loài D có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.
- IV. Loài F tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài G.



A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

Câu 112. Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của quần thể này qua các thế hệ, người ta thu được kết quả ở bảng sau:

Thế hệ	P	F ₁	F ₂	F ₃
Tần số kiểu gen AA	2/5	9/16	16/25	25/36
Tần số kiểu gen Aa	2/5	6/16	8/25	10/36
Tần số kiểu gen aa	1/5	1/16	1/25	1/36

Cho rằng quần thể này không chịu tác động của nhân tố đột biến, di - nhập gen và các yếu tố ngoại nhiên. Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Cây hoa đỏ không có khả năng sinh sản và quần thể này giao phấn ngẫu nhiên.
- B. Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần thể này giao phấn ngẫu nhiên.
- C. Cây hoa hồng không có khả năng sinh sản và quần thể này tự thụ phấn nghiêm ngặt.
- D. Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần thể này tự thụ phấn nghiêm ngặt.

Đề Thi THPT Quốc Gia

Câu 113. Nuôi cây các hạt phấn của một cây có kiều gen AaBbDDee để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônixin để gây lưỡng bội hoá, thu được 80 cây lưỡng bội. Cho biết không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, khi nói về 80 cây này, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Trong các cây này, có cây mang kiều gen AAbbDDee.
- B. Các cây này có tối đa 9 loại kiều gen.
- C. Các cây này có kiều gen đồng hợp từ về cả 4 cặp gen trên.
- D. Mỗi cây giảm phân bình thường chỉ cho 1 loại giao tử.

Câu 114. Một loài động vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thê ba?

- | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-------|
| I. AaaBbDdEe. | II. ABBbDdEe. | III. AaBBbDdEe. | |
| IV. AaBbDdEe. | V. AaBbDdEEe. | VI. AaBbDddEe. | |
| A. 4. | B. 3. | C. 5. | D. 2. |

Câu 115. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F₁ gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F₁ tự thụ phấn, thu được F₂ có kiều hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Trong tổng số cây hoa hồng ở F₂, số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 2/3.
- II. Các cây hoa đỏ không thuần chủng ở F₂ có 3 loại kiều gen.
- III. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F₂ giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F₂, thu được F₃ có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 11/27.
- IV. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F₂ giao phấn với cây hoa trắng, thu được F₃ có kiều hình phân li theo tỉ lệ: 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| A. 2. | B. 1. | C. 3. | D. 4. |
|-------|-------|-------|-------|

Câu 116. Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P), thu được F₁ gồm 100% cá thể lông quăn, đen. Cho F₁ giao phối với nhau, thu được F₂ có kiều hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.
- II. Trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở F₁ đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.
- III. Nếu cho cá thể đực F₁ giao phối với cá thể cái lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể cái lông quăn, đen chiếm 50%.
- IV. Nếu cho cá thể cái F₁ giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm 5%.


- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| A. 3. | B. 1. | C. 2. | D. 4. |
|-------|-------|-------|-------|

Câu 117. Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy định mắt đờ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: $\frac{AB}{ab} X^D X^d \times \frac{AB}{ab} X^D Y$, thu được F₁. Trong tổng số ruồi F₁, số ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đờ chiếm 3,75%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử cái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. F₁ có 40 loại kiều gen.
- II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM.
- III. F₁ có 10% số ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đờ.
- IV. F₁ có 25% số cá thể cái mang kiều hình trội về hai tính trạng.

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| A. 2. | B. 4. | C. 3. | D. 1. |
|-------|-------|-------|-------|

Câu 118. Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh P do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh M do một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?



- A. Xác suất sinh con thứ nhất là con gái và không bị bệnh của cặp 12 - 13 là 5/12.
- B. Xác suất sinh con thứ nhất bị cả hai bệnh của cặp 12 - 13 là 1/24.
- C. Người số 7 không mang alen quy định bệnh P.
- D. Xác định được chính kiểu gen của 9 người trong phả hệ.

Câu 119. Một quần thể lưỡng bội, xét một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội là trội hoàn toàn. Thể hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể của quần thể. Qua ngẫu phôi, thể hệ F₁ có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Thể hệ P đang ở trạng thái cân bằng di truyền.
- II. Thể hệ P có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70%.
- III. Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội ở thể hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5%.
- IV. Cho tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở thể hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu được đời con có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256.

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 120. Một gen có 1200 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 200 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Mạch 1 của gen có A/G = 15/26. II. Mạch 1 của gen có $(T + X)/(A + G) = 19/41$.
- III. Mạch 2 của gen có A/X = 2/3. IV. Mạch 2 của gen có $(A + X)/(T + G) = 5/7$.

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

----- HẾT -----

Đáp án

81	C	91	A	101	A	111	D
82	C	92	B	102	C	112	B
83	A	93	D	103	B	113	D
84	C	94	B	104	D	114	A
85	A	95	B	105	A	115	A
86	D	96	D	106	B	116	A
87	C	97	B	107	D	117	D
88	A	98	B	108	B	118	A
89	D	99	A	109	A	119	B
90	D	100	D	110	B	120	D

Theo thông báo kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 sẽ diễn ra vào các ngày 26, 27, 28/6. Ngay sau khi các thí sinh kết thúc buổi thi, chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất Đề Thi - Đáp Án môn Vật lí. Bạn có thể xem tại đây:

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018

Đề Thi THPT Quốc Gia

Đề Thi Môn Sinh THPT Quốc Gia – Đề Thi THPT Quốc Gia 2017