

## GIẢI TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ LỚP 12 – BÀI 2 TRANG 20

### Câu hỏi

Lựa chọn và nêu những biểu hiện rõ nét của các thành phần tự nhiên phân hóa theo độ cao và hoàn thành bảng sau:

Các đai		Khí hậu	Đất	Sinh vật
Nhiệt đới gió mùa chân núi (600-700mm)				
Cận nhiệt đới gió mùa trên núi (600 - 700m đến 2600m)	Từ 600 - 700 đến 1600 – 1700m			
	Từ 1600 – 1700 đến 2600m			
Cận nhiệt đới gió mùa trên núi (trên 2600m)				

### Lời giải bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lý lớp 12

Các đai		Khí hậu	Đất	Sinh vật
Nhiệt đới gió mùa chân núi (600-700mm)		Tính chất nhiệt đới: nhiệt độ cao, mùa hạ nắng nóng, độ ẩm thay đổi tùy nơi.	- Nhóm đất phù sa: 24% diện tích; gồm: phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn, đất cát pha.  - Nhóm đất feralit: chiếm 60%; gồm: feralit đỏ vàng, feralit nâu đỏ, feralit trên đá badan...	- Rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh. - Rừng nhiệt đới gió mùa, rừng thường xanh, rừng nửa rụng lá, rừng thưa nhiệt đới
Cận nhiệt đới gió mùa trên núi (600 - 700m đến 2600m)	Từ 600 - 700 đến 1600 – 1700m	Khí hậu mát mẻ, độ ẩm tăng, nhiệt độ giảm.	Đất feralit có mùn đặc tính chua	Sinh vật cận nhiệt đới lá rộng và lá kim
	Từ 1600 – 1700 đến 2600m	Khí hậu lạnh, nhiệt độ thấp	Đất mùn	Sinh vật cận nhiệt đới lá rộng và lá kim, sinh vật thấp nhỏ đơn giản về thành phần loài
Cận nhiệt đới gió mùa		Tính chất ôn đới,	Đất mùn thô	Một số loài thực vật ôn

trên núi (trên 2600m)	quanh năm nhiệt độ < 15°C, mùa đông nhiệt độ < 5°C.		đới (đỗ quyên...
-----------------------	---	--	------------------

\*\*\*

Để giúp các em học tốt môn [Địa lí lớp 12](#) một cách dễ dàng và chuẩn bị cho cả các kì thi cuối cấp quan trọng, doctailieu.com tổng hợp và chia sẻ cho các em học sinh nội dung [Giải bài tập Tập bản đồ Địa lí lớp 12](#) ngắn gọn, chính xác nhất. Chúc các em học tốt môn Địa lí.